

CALCOLO DELLE PROBABILITÀ E STATISTICA 2021/2022

SCHEDA DI ESERCIZI 5 - VARIABILI ALEATORIE CONTINUE

Esercizio 1. Il raggio R di un certo tipo di particella inquinante, espresso in micron, è una variabile aleatoria continua con densità

$$f_R(x) = \begin{cases} c x e^{-x^2}, & \text{per } x > 0, \\ 0, & \text{per } x \leq 0. \end{cases}$$

- (a) Trovare il valore della costante c .
- (b) Determinare la funzione di ripartizione di R .
- (c) Calcolare la media di R . [Si usi che $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$]
- (d) Calcolare la probabilità che una particella abbia un raggio superiore a 2 micron.

Sia ora X la variabile aleatoria che vale 1 se $R < 2$ e 0 altrimenti.

- (e) Mostrare che X è una variabile aleatoria discreta. Determinarne supporto e densità discreta.

Esercizio 2. Sia X una v.a.c. con densità

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & |x| \geq 1, \\ 1/4, & -1 < x < 0, \\ a(1 - x^3), & 0 \leq x < 1, \end{cases}$$

- (a) Si trovi il valore del parametro a .
- (b) Calcolare le seguenti quantità:

$$\mathbb{P}(X \leq 1/2), \quad \mathbb{P}(-1/4 \leq X \leq 1/4), \quad \mathbb{P}(X = 0), \quad \mathbb{P}(X \leq 3), \quad \mathbb{E}[X], \quad \text{Var}(X).$$

- (c) Determinare la funzione di ripartizione di X .

Esercizio 3. Sia X una variabile aleatoria continua con funzione di ripartizione

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ (1 - e^{-x})^2, & x \geq 0. \end{cases}$$

Determinare:

- (a) la densità di X ,
- (b) $\mathbb{P}(X > 1)$,
- (c) $\mathbb{P}(1 < X < 2)$.

Esercizio 4. Sia X una variabile aleatoria continua con funzione di ripartizione

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 1 - e^{1-x}, & x \geq 1. \end{cases}$$

- (a) Determinare la densità di X .
- (b) Calcolare media e varianza di X .

(c) Qual è la densità continua della variabile aleatoria $Y = e^X$?

Esercizio 5. Sia X una variabile aleatoria continua con densità

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\lambda} e^{-x^2/\lambda}, & \text{per } x > 0, \\ 0, & \text{per } x \leq 0. \end{cases}$$

Determinare i possibili valori di λ .

Esercizio 6. Si consideri una v.a.c. X con densità

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-(x-\lambda)}, & x > \lambda, \\ 0, & x \leq \lambda. \end{cases}$$

- (a) Determinare λ .
- (b) Calcolare la funzione di ripartizione di X .
- (c) Si calcoli $\mathbb{P}(X > 3)$ e $\mathbb{P}(X^3 > 27)$.
- (d) Si calcoli la media di $3X^2 - 1$.

Esercizio 7. Sia X una v.a.c. con densità

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}x^2, & -k < x < k, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

- (a) Si trovi il valore del parametro k .
- (b) Determinare la funzione di ripartizione di X .
- (c) Calcolare media e varianza di X .

Esercizio 8. Sia X la variabile aleatoria che misura il tempo di vita di una lampadina ad incandescenza (in ore). Supponiamo che X abbia legge esponenziale di parametro $\lambda = 0.001$ ($X \sim \text{Exp}(0.001)$), ovvero X è una v.a.c. con densità

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 0.001 e^{-0.001 x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

- (a) Calcolare la probabilità che una lampadina acquistata a inizio marzo non debba essere cambiata per tutto il mese.
- (b) Si sa che le lampadine alogene, invece, hanno un tempo di vita $Y = 5X$. Determinare la densità continua di Y .
- (c) Il tempo di vita di un nuovo tipo di lampadina è $Z = e^{X/2500}$. Qual è la densità continua di Z ?

Esercizio 9. Un'industria produce su commissione delle sbarre d'acciaio cilindriche, il cui diametro dovrebbe essere di 4 cm, ma che tuttavia sono accettabili se hanno diametro compreso fra 3.95 cm e 4.05 cm. Supponiamo che X sia variabile aleatoria normale X ($X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$), ovvero che X sia una v.a.c. con densità

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}}, \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

- (a) Sapendo che X ha media 4 e varianza 0.09, determinare la probabilità che il diametro sia accettabile. [Si esprima il risultato nella forma $\Phi(x) - \Phi(-x)$, per qualche $x > 0$]
- (b) Sapendo che X ha media 4 e varianza 0.09, determinare la probabilità che il diametro sia inferiore a 4.
- (c) Supponiamo ora di non conoscere μ e σ , ma di sapere, da un controllo accurato, che il 5% delle sbarre ha diametro inferiore al minimo tollerato, mentre il 12% superiore al massimo tollerato. Determinare media e deviazione standard di X . [Si usi che $\Phi^{-1}(0.05) \simeq -1.645$ e $\Phi^{-1}(0.88) \simeq 1.175$, dove Φ^{-1} denota la funzione inversa di Φ]

Esercizio 1.

(a) 2

$$(b) F_R(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-x^2}, & x \geq 0. \end{cases}$$

$$(c) \mathbb{E}[R] = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \simeq 0.8862.$$

$$(d) \mathbb{P}(R > 2) = 1 - F_R(2) \simeq 0.0183.$$

(e) X è una v.a.d. con $\mathcal{S}_X = \{0, 1\}$ e

$$\frac{X}{p_X} \mid \begin{array}{c|c} 0 & 1 \\ \hline 1-p & p \end{array}$$

dove $p = \mathbb{P}(R < 2) = \mathbb{P}(R \leq 2) = 1 - \mathbb{P}(R > 2) \simeq 1 - 0.0183 = 0.9817$. Quindi X ha distribuzione di Bernoulli di parametro $p \simeq 0.9817$, cioè $X \sim B(0.9817)$.

Esercizio 2.

(a) Notiamo che $f_X(x) \geq 0$ per ogni x se e solo se $a \geq 0$. Inoltre

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{4} dx + a \int_0^1 (1 - x^3) dx,$$

da cui si ottiene $a = 1$.

(b)

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \leq \frac{1}{2}) &= \int_{-\infty}^{1/2} f_X(x) dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{4} dx + \int_0^{1/2} (1 - x^3) dx = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{64} = \frac{47}{64}, \\ \mathbb{P}(-\frac{1}{4} \leq X \leq \frac{1}{4}) &= \frac{319}{1024}, \\ \mathbb{P}(X = 0) &= 0, \\ \mathbb{P}(X \leq 3) &= 1. \end{aligned}$$

Inoltre

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_{-1}^0 \frac{x}{4} dx + \int_0^1 x(1 - x^3) dx = \frac{7}{40}, \\ \mathbb{E}[X^2] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx = \int_{-1}^0 \frac{x^2}{4} dx + \int_0^1 x^2(1 - x^3) dx = \frac{3}{12}, \end{aligned}$$

quindi

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = \frac{3}{12} - \left(\frac{7}{40}\right)^2 \simeq 0.2194.$$

(c)

$$F_X(t) = \int_{-\infty}^t f_X(x) dx = \begin{cases} 0, & t < -1, \\ t/4 + 1/4, & -1 \leq t < 0, \\ 1/4 + t - t^4/4, & 0 \leq t < 1, \\ 1, & t \geq 1. \end{cases}$$

Esercizio 3.

$$(a) f_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 2(e^{-x} - e^{-2x}), & x > 0. \end{cases}$$

(b) 0.6

(c) 0.348

Esercizio 4.

$$(a) f_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ e^{1-x}, & x \geq 1. \end{cases}$$

(b)

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_1^{+\infty} x e^{1-x} dx = -[x e^{1-x}]_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} e^{1-x} dx \\ &= 1 - [e^{1-x}]_1^{+\infty} = 2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X^2] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx = \int_1^{+\infty} x^2 e^{1-x} dx \\ &= -[x^2 e^{1-x}]_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} 2x e^{1-x} dx = 1 + 2\mathbb{E}[X] = 5, \end{aligned}$$

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = 5 - 4 = 1.$$

(c)

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq e, \\ \frac{e}{y^2}, & y > e. \end{cases}$$

Esercizio 5. $\lambda > 0$

Esercizio 6.

(a) $\lambda = 1$

$$(b) F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 1 - e^{-(x-1)}, & x \geq 1. \end{cases}$$

(c) e^{-2}

(d) 14

Esercizio 7

(a)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = \int_{-k}^{+k} \frac{3}{2} x^2 dx = \left[\frac{1}{2} x^3 \right]_{-k}^{+k} = k^3,$$

da cui si ottiene $k = 1$.

(b)

$$F_X(t) = \begin{cases} 0, & t < -1, \\ \frac{t^3 + 1}{2}, & -1 \leq t < 1, \\ 1, & t \geq 1. \end{cases}$$

(c) $\mathbb{E}[X] = 0$ and $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] = 3/5$.

Esercizio 8.

(a) $\mathbb{P}(X > 744) = \int_{744}^{+\infty} 0.001 e^{-0.001x} dx = e^{-0.744} \simeq 0.4752$.

(b) $f_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ 0.0002 e^{-0.0002y}, & y \geq 0. \end{cases}$

(c) $f_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 1, \\ 2.5 z^{-3.5}, & z \geq 1. \end{cases}$

Esercizio 9.

(a) Il risultato è $\Phi(0.167) - \Phi(-0.167) \simeq 0.1326$. Infatti, si noti che “il diametro è accettabile” = $\{3.95 \leq X \leq 4.05\}$. Si noti inoltre che la v.a.

$$Z = \frac{X - 4}{0.3}$$

ha legge normale standard. Quindi

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(3.95 \leq X \leq 4.05) & \stackrel{\substack{= \\ \uparrow \\ \text{standardizzazione}}}{=} \mathbb{P}\left(\frac{3.95 - 4}{0.3} \leq \frac{X - 4}{0.3} \leq \frac{4.05 - 4}{0.3}\right) \\ & = \mathbb{P}(-0.167 \leq Z \leq 0.167) = \Phi(0.167) - \Phi(-0.167) \simeq 0.1326. \end{aligned}$$

(b) 1/2

(c) Sappiamo che

$$\mathbb{P}(X < 3.95) = 0.05, \quad \mathbb{P}(X > 4.05) = 0.12.$$

Sappiamo inoltre che

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

ha legge normale standard. Quindi standardizzando possiamo riscrivere le due uguaglianze riportate sopra in termini di Z :

$$\mathbb{P}\left(Z < \frac{3.95 - \mu}{\sigma}\right) = 0.05, \quad \mathbb{P}\left(Z > \frac{4.05 - \mu}{\sigma}\right) = 0.12.$$

Esprimiamo ora queste due uguaglianze in termini di Φ , la funzione di ripartizione di Z . Poiché

$$\Phi\left(\frac{3.95 - \mu}{\sigma}\right) = \mathbb{P}\left(Z < \frac{3.95 - \mu}{\sigma}\right), \quad \Phi\left(\frac{4.05 - \mu}{\sigma}\right) = 1 - \mathbb{P}\left(Z > \frac{4.05 - \mu}{\sigma}\right),$$

abbiamo che

$$\Phi\left(\frac{3.95 - \mu}{\sigma}\right) = 0.05, \quad \Phi\left(\frac{4.05 - \mu}{\sigma}\right) = 0.88.$$

Quindi

$$\frac{3.95 - \mu}{\sigma} = \Phi^{-1}(0.05) \simeq -1.645, \quad \frac{4.05 - \mu}{\sigma} = \Phi^{-1}(0.88) \simeq 1.175.$$

Per cui, risolvendo il sistema lineare nelle incognite μ e σ :

$$\begin{cases} 3.95 - \mu = -1.645 \sigma \\ 4.05 - \mu = 1.175 \sigma \end{cases}$$

si ottiene $\mu = 4.0083$ e $\sigma = 0.0355$.